

Studieresume (6)

MIDLERTIDIG DIARRÉ

50 patienter – studie over 1 uge

22 med akut diarré og 28 med kronisk diarré.

Gruppen med kronisk diarré var forud behandlet med andre midler uden resultat.

Dosering:

2 tsk. Ispaghula Husk 3 gange dagligt

Resultat

Normalisering af afføring startet efter 3 dage

Efter 7 dage fuldt normal afføring – ingen diarré

Akut diarré:

Før: 4,7 toiletbesøg per dag

Efter: 1,6 toiletbesøg pr. dag

Kronisk diarré:

Før: 3,4 toiletbesøg per dag

Efter: 1,5 toiletbesøg pr. dag

2 patienter udgik pga. infektion (akut diarré)

4 blev ikke hjulpet (kronisk diarré)

Konklusion:

Ispaghula Husk kan normalisere afføring ved diarré.

Studie : "Die Behandlung der akuten und chronischen Diarrhö mit Agiocur"

Kilde: Med. Klin. 79

Forfatter: W. Hamouz

Årstal: 1984

HUSK®

W. Ratje Frøskaller ApS • Kirstinehøj 34 • DK-2770 Kastrup
Tlf. +45 32519600 • Fax +45 32519250 • info@mail.dk • www.husk.dk